Sitzen wir bald endgültig auf dem Trockenen?

Die Entwicklung unserer Böden unter zunehmender Trockenheit

Friederike Lang, Professur für Bodenökologie, Uni Freiburg

Fragen:

1. Wie reagieren Waldböden auf Trockenheit und was sind die Auswirkungen?
 - 1.1 Wasserabhängige Bodenprozesse
 - 1.2 Bestandesabhängige Bodenprozesse
2. Wie können wir negative Auswirkungen minimieren?

1.1 Wie reagieren Waldböden auf Trockenheit – **wasserabhängig Bodenprozesse**

Bildung von Trockenrissen

Dr. Wolfgang Fleck, Regierungspräsidium Freiburg

Bildung von Trockenrissen

Verletzungsgefahr für Wurzeln
Kontakt zum Boden geht verloren

Verminderte Stoff- und
Wasserrückhaltekapazität bei
einsetzendem Regen

Nach Locke, 1997

Bodenoberflächen werden benetzungsgehemmt

Benetzungshemmung bei Wiederbefeuchtung nach Austrocknung

(Kalbitz et al. 2004, Gimbel et al. 2015, Dincher et al. 2020)

Biologische Aktivität im Boden nimmt ab

- Geringere Häufigkeit von Bodentieren
- Verminderte mikrobielle Aktivität

Konsequenz für die Kohlenstoffspeicherung in Böden???

Bewässerung eines Kiefernbestandes im inneralpinen Trockental erhöht die Häufigkeit der Bodentiere um das bis zu 8-fache (Guidini et al. 2022)

Organische Bodensubstanz als bedeutendster CO₂ Speicher terrestrischer Ökosysteme

Kapazität

Verweilzeit

Swift 2001, Houghton 2005, Fontaine et al. 2007, Hamilton 2007, Hartmann und Kempe 2008

Wissensgenerierung im Regenausschlussexperiment

Kranzberger Roof Experiment KROOF – Hans Pretzsch TUM

Akkumulation organischer Substanz bei Trockenheit?

Humusauflage als charakteristischer Bestandteil von Waldböden

- **Humusauflage:**

Streu in unterschiedlichen Zersetzungsstadien, die dem Mineralboden aufliegt (mehr als 30% (w/w) sind organisch)

- **Zusammengesetzt aus:**

- OL – wenig zersetzte Streu
- OF – zerkleinerte Streu
- OH – humifizierte Streu

Schmilzt die Humusauflage?

Abb. 2. Veränderung der Humusformenverteilung bei der Wiederholungsbeprobung der Standorte der Bodenzustandserhebung (BZE) in Baden-Württemberg (n=197; Daten aus Hartmann *et al.* 2016)

Anteil von Mull-Standorten an den BZE Punkten in Baden-Württemberg

1990: 28%

2008: 45%

DFG Forschungsgruppe FOREST FLOOR

Functioning, Dynamics, and Vulnerability in a Changing World

Forest Floor

FOR 5315

Schicksal von Stickstoff und Kohlenstoff aus Buchenstreu in Abhängigkeit von Temperatur, Nährstoffverfügbarkeit und Baumart

Frank Hagedorn

Kranzberger Forst Experiment – Die Frage nach mittelfristigen Wirkungen

Mineralisierungsschübe bei wiedereinsetzendem Regen

- Erhöhte C-Mobilisierung (Brunn et al. 2023)
- Schnelle Mobilisierung von Nährstoffen und Auswaschungsverluste (Brödlin et al. 2021)

1.2 Wie reagieren Waldböden auf Trockenheit – bestandesabhängig **Bodenprozesse**

- Veränderter Biomasse-Input in die Böden
- Verändertes Bestandesklima

Standortabhängigkeit des Einflusses von Bestandesstörungen auf den Humusvorrat

Zusammenfassung: Auswirkungen

- Die Bodenstruktur und damit die Wasserhaltekapazität der Böden wird negativ beeinflusst
- Oberflächenabfluss von Wasser wird verstärkt
- Böden binden weniger CO₂ und bereits gebildete organische Bodensubstanz kann verstärkt abgebaut werden
- Es kommt zur Entkopplung von Nährstoffmobilisierung und Nährstoffaufnahme und dadurch zu Nährstoffauswaschung

2. Negative Einflüsse der Trockenheit auf Böden minimieren

Wasserrückhaltekapazität der Böden schützen/optimieren.....

Baumart vs. Wasserspeichervermögen

- Keine Entwässerungssysteme bei der Holzernte erzeugen
- Drainagegräben wo immer möglich rückbauen
- Wasser von Forstwegen zurück in den Wald leiten

Wasser im Wald halten

Bestandesdichte anpassen

Rehfuess 1990, Zellweger et. al. 2020, Sohn et al. 2012, Gebhardt et al. 2014, Ringgaard et al. 2012, Bauhus et al. 2004, Brödlin et al. 2019

...und Verjüngung fördern

Stärkere Verjüngung
schützt den Boden im
Störungsfall

*(s. auch Wohlgemuth et al. 2016,
Lang und Kleinschmit 2022)*

Zusatzfolien

—————> zunehmende biologische Bodenaktivität >—————

stark gehemmte biologische Aktivität

leicht gehemmte biologische Aktivität

sehr hohe biologische Bodenaktivität

< 4
sehr stark sauer bis äusserst sauer

pH-Wert
stark sauer

4 bis >7
sauer bis alkalisch

Chemische Struktur organischer Bodensubstanz:

Wasser-anziehende Molekülbereiche

Wasser-abstoßende Molekülbereiche

Humic acid, model, *Schulten 1998*

Umstrukturierung der organischen Moleküle bei Austrocknung

- Wasser-anziehende Molekülbereiche
- Wasser-abstoßende Molekülbereiche

Mikutta et al. 2006